

И н ф о р м а ц и о н н о е д о п о л н е н и е

Примеры некоторых схем применения Эрбисола® как препарата сопровождения при химиотерапии онкологических больных.

Для каждого больного схема применения Эрбисола® корректируется индивидуально.

1. Курс химиотерапии с введением химиопрепаратов (ХП) **внутриопухолево**.

25-30 мг порошка препарата Доксорубицина растворяют в 2 мл Эрбисола®;

25-30 мг порошка препарата Платины растворяют в 2 мл Эрбисола®;

За 1 сеанс химиотерапии **внутриопухолево** вводят до 30 мг Доксорубицина + до 30 мг Платины.

Всего на курс: 90-120 мг Доксорубицина + до 100 мг Платины.

Дни Время	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 амп. = 2 мл Эрбисола®
6 ⁰⁰ – 8 ⁰⁰		э		э		э		э	э	э			в/м введение по 1 амп. Эрбисола®
Химио- терапия			2Э ХП		2Э ХП		2Э ХП		*				внутриопухолево е введение по 2+2+2 амп. Эрбисола® перед ХП
16 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰			э	э	э	э	э	э					в/м введение по 1 амп. Эрбисола®
22 ⁰⁰ – 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	в/м введение по 1 амп. Эрбисола®

Примечание: в/м - внутримышечное введение,

в/о - внутриопухолевоe введение,

* - в случае необходимости дополнительного введения ХП

Всего 30 ампул по 2 мл Эрбисола® в течение 12 дней.

2. Курс химиотерапии с введением химиопрепаратов (ХП) **внутриартериально**.

100 мг Доксорубицина растворяют в 800 мл Физ. р-ра; 1,5 г Циклофосфана в 400 мл Физ. р-ра.

1 ампулу (2 мл) Эрбисола® вводят **внутриартериально** перед каждыми 200 мл Физ. р-ра.

1-й сеанс - 100 мг Доксорубицина, вводят 4 ампулы (8 мл) Эрбисола®;

2-й сеанс - 1,5 г Циклофосфана, вводят 2 ампулы (4 мл) Эрбисола®.

Всего на курс: 100 мг Доксорубицина (за 1 сеанс) + 1,5 г Циклофосфана.

Дни Время	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 амп. = 2 мл Эрбисола®
6 ⁰⁰ – 8 ⁰⁰		э	э		э		э	э	э	э			в/м введение по 1 амп. Эрбисола®
Химио- терапия				4Э ХП		2Э ХП							внутриартериальное введение по 4 + 2 амп. Эрбисола® перед ХП
16 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰				э	э	э	э	э					в/м введение по 1 амп. Эрбисола®
22 ⁰⁰ – 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	в/м введение по 1 амп. Эрбисола®

Примечание: в/м - внутримышечное введение,

в/а - внутриартериальное введение.

Всего 30 ампул по 2 мл Эрбисола® в течение 12 дней.

3. Курс химиотерапии с введением химиопрепаратов (ХП) **внутривенно**.

50 мг Доксорубицина растворяют в 400 мл Физ. р-ра; 1,5 г Циклофосфана в 400 мл Физ. р-ра.

1 ампулу (2 мл) Эрбисола® вводят **внутривенно** перед каждыми 200 мл Физ. р-ра.

1-й сеанс - 50 мг Доксорубицина, вводят 2 ампулы (4 мл) Эрбисола®;

2-й сеанс - 50 мг Доксорубицина, вводят 2 ампулы (4 мл) Эрбисола®;

3-й сеанс - 1,5 г Циклофосфана, вводят 2 ампулы (4 мл) Эрбисола®.

Всего на курс: 100 мг Доксорубицина (за 2 сеанса) + 1,5 г Циклофосфана.

Дни Время	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 амп. = 2 мл Эрбисола®
6 ⁰⁰ – 8 ⁰⁰		э		э		э		э	э	э			в/м введение по 1 амп. Эрбисола®
Химио- терапия			2э ХП		2э ХП		2э ХП						внутривенное введение по 2+2+2 амп. Эрбисола® перед ХП
16 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰			э	э	э	э	э	э					в/м введение по 1 амп. Эрбисола®
22 ⁰⁰ – 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	в/м введение по 1 амп. Эрбисола®

Примечание: в/м - внутримышечное введение,
в/в - внутривенное введение.

Всего 30 ампул по 2 мл Эрбисола® в течение 12 дней.

4. Курс химиотерапии с введением химиопрепаратов (ХП) внутривенно.

40 мг Доксорубина растворяют в 300 мл Физ. р-ра; 2,0 г Винкристина в 250 мл Физ. р-ра;
1,0 г Циклофосфана в 250 мл Физ. р-ра; 10-15 мг Блеомицина в 200 мл Физ. р-ра.

1 ампулу (2 мл) Эрбисола® вводят **внутривенно** перед каждыми 200 мл Физ. р-ра.

I. 40 мг Доксорубина + 2,0 г Винкристина + 1,0 г Циклофосфана;

II. 40 мг Доксорубина + 2,0 г Винкристина + 1,0 г Циклофосфана + 10-15 мг Блеомицина;

III. 10-15 мг Блеомицина.

Всего на курс: 80 мг Доксорубина + 4,0 г Винкристина + 2,0 г Циклофосфана +
+ 20-30 мг Блеомицина.

Дни Время	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1 амп. = 2 мл Эрбисола®	
6 ⁰⁰ – 8 ⁰⁰		э	э		э	э	э						э	э	э					э	э			в/м введение по 1 амп. Эрбисола®
Химио- терапия				4э ХП							5э ХП							2э ХП						внутривенное введение по 4+5+2 амп. Эрбисола® перед ХП
16 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰				э	э	э					э	э	э					э						в/м введение по 1 амп. Эрбисола®
22 ⁰⁰ – 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	в/м введение по 1 амп. Эрбисола®

Примечание: в/м - внутримышечное введение,
в/в - внутривенное введение.

Всего 50 ампул по 2 мл Эрбисола® в течение 22 дней.

5. Курс химиотерапии с введением химиопрепаратов (ХП) внутриартериально (в/а).

100 мг препарата Цисплатина растворяют в 800 мл Физ. р-ра;

50 мг препарата группы Доксорубина растворяют в 400 мл Физ. р-ра;

2 000 мг 5-Фторурацила растворяют в 400 мл Физ. р-ра.

1 ампулу (2 мл) Эрбисола® вводят **внутриартериально** перед каждыми 200 мл Физ. р-ра.

1-й сеанс - 25 мг Цисплатины + 25 мг Доксорубина, вводят 2 ампулы (4 мл) Эрбисола®;

2-й сеанс - 25 мг Цисплатины + 1000 мг 5-Фторурацила, вводят 2 ампулы (4 мл) Эрбисола®;

3-й сеанс - 25 мг Цисплатины + 25 мг Доксорубина, вводят 2 ампулы (4 мл) Эрбисола®;

4-й сеанс - 25 мг Цисплатины + 1000 мг 5-Фторурацила, вводят 2 ампулы (4 мл) Эрбисола®.

Всего на курс: 100 мг Цисплатина + 50 мг Доксорубина + 2 000 мг 5-Фторурацила.

Дни Время	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 амп. = 2 мл Эрбисола®
6 ⁰⁰ – 8 ⁰⁰		э	э					э	э	э			в/м введение по 1 амп. Эрбисола®
Химио- терапия				2э ХП	2э ХП	2э ХП	2э ХП						внутриартериальное введение по 4 x 2 амп. Эрбисола® перед ХП
16 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰				э	э	э	э	э					в/м введение по 1 амп. Эрбисола®
22 ⁰⁰ – 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	в/м введение по 1 амп. Эрбисола®

Примечание: в/м - внутримышечное введение,
в/а - внутриартериальное введение.

Всего 30 ампул по 2 мл Эрбисола® в течение 12 дней.