ДЕРМАТОЛОГИЯ

В комплексном лечении ***псориаза*** применять **системную терапию пульсирующего и интенсивного комбинированного курса иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации препаратами ЭРБИСОЛ® и ЭРБИСОЛ® Экстра.**

1-й лечебный пульсирующий курс 30 дней
50 ампул (2 мл) ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Время																														
6^{00} - 9^{00}				э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э	
21^{00} - 24^{00}	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э

↕3 дня↕ 5 дней ↕2дня↕ 5 дней ↕2дня↕ 5 дней ↕2дня↕ 5 дней ↕1↕

Рекомендовано с 11-го дня назначить местное применение специфических лечебных мазей и кремов в течение 10-20 дней.
2-й курс назначать через 2 месяца после окончания 1-го курса или при рецидиве.

2-й лечебный интенсивный комбинированный курс 21 день
20 ампул ЭРБИСОЛа® (э) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)
желательно начинать за 2 дня до новолуния

новолуние ↓ ↓ **полнолуние** ↓ ↓

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Время																					
6^{00} - 9^{00}		2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+
21^{00} - 24^{00}	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	

↕1↕ 19 дней ↕1↕

Инъекции препаратов желательно делать на голодный желудок за 1-2 часа до еды или через 2-3 часа после еды. Чай, соки, воду и т.п. можно употреблять в любое время.

Примечание:
э - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® внутримышечно;
+ - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® Экстра внутримышечно.