

# ГИНЕКОЛОГИЯ

В комплексном лечении *бесплодия, вызванного персистирующей инфекцией, кист яичников и лейомиомы* применять **системную терапию пульсирующего и стандартного курсов** иммуномодуляции, гепатопротекции, репарации и адаптации препаратом ЭРБИСОЛ®.

## 1-й лечебный **пульсирующий курс** 30 дней 50 ампул ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Время																															
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>				э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э		
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	

3 дня ↓ 5 дней ↓ 2дня ↓ 5 дней ↓ 2дня ↓ 5 дней ↓ 2дня ↓ 5 дней ↓ 2дня ↓ 5 дней ↓ 1 ↓

Через 2 месяца после окончания 1-го курса провести 2-й курс.

## 2-й лечебный **стандартный курс** 20 дней 30 ампул ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>				э	э	э	э	э	э	э	э	э									
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э

3 дня ↓ 10 дней ↓ 7 дней ↓

Инъекции препаратов желательно делать на голодный желудок за 1-2 часа до еды или через 2-3 часа после еды. Чай, соки, воду и т.п. можно употреблять в любое время.

Примечание:

э - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® внутримышечно.