

НЕВРОЛОГИЯ

1. В комплексной терапии *при реабилитации постинсультных состояний* применять **стандартный пролонгированный курс** иммуномодуляции, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратом ЭРБИСОЛ® Экстра.

Лечебный курс 20-30 дней
40-60 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Время																															
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

↓ 20-30 дней ↓

2. В комплексной терапии *при реабилитации больных с демиелизирующими полиневропатиями, болезнью Паркинсона* применять **полуинтенсивный пульсирующий курс** препарата.

Лечебный курс с 2-3 пятидневками 25-30 дней
с 2 пятидневками 25 дней 60 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Время																									
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰	+	+	+	+	+	+	+	2+	2+	2+	2+	2+	+	+	2+	2+	2+	2+	2+	+	+	+	+	+	
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

↓ 7-9 дней ↓ 5 дней ↓ 2дня ↑ 5 дней ↓ 6 дней ↓

с 3 пятидневками 30 дней 75 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Время																														
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰	+	+	+	+	+	+	+	2+	2+	2+	2+	2+	+	+	2+	2+	2+	2+	2+	+	+	2+	2+	2+	2+	+	+	+	+	
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

↓ 7-9 дней ↓ 5 дней ↓ 2дня ↑ 5 дней ↓ 2дня ↓ 5 дней ↓ 4 дня ↓

3. В комплексной терапии *рассеянного склероза* применять **интенсивный комбинированный пульсирующий курс** иммунотерапии, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратами Эрбисол® Ультрафарм и Эрбисол® Экстра.

Лечебный курс 24 дня
20 ампул Эрбисол® Ультрафарм (у) + 35-40 ампул Эрбисол® Экстра (+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Время																								
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰		+	+	2+	2+	2+	2+	2+	+	+	2+	2+	2+	2+	+	+	2+	2+	2+	2+				
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	у	у	у	у	у	у	у	у	+	+	у	у	у	у	+	+	у	у	у	у	у	у	у	

3 дня ↓ 5 дней ↓ 2дня ↑ 5 дней ↓ 2дня ↑ 5 дней ↓ 2дня ↓

В случае появления напряженности мышц, приводящее к ухудшению двигательных функций, во 2-й и 3-й пятидневках можно снизить дозу Эрбисол® Экстра и применять препарат утром поочередно – один день 2 ампулы 2+ (4,0 мл), другой 1 ампула 2+ (2,0 мл).

Примечание:

- + - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® Экстра внутримышечно;
- у - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм внутримышечно.