

# ХИРУРГИЯ

1. В **постоперационный период** применять **интенсивный комбинированный пролонгированный курс** иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации препаратами ЭРБИСОЛ® и ЭРБИСОЛ® Экстра.

Лечебный курс 27 дней.

30 ампул ЭРБИСОЛа® (э) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Время																												
6 <sup>00</sup> - 9 <sup>00</sup>								2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+
21 <sup>00</sup> - 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	↑							↓																				↓
								7 дней							20 дней													

2. В комплексной терапии **фурункулезов и трофических язв** применять **системную терапию пульсирующего и интенсивного комбинированного курса** иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации препаратами ЭРБИСОЛ® и ЭРБИСОЛ® Экстра.

1-й лечебный **пульсирующий курс** 30 дней

50 ампул ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Время																														
6 <sup>00</sup> - 9 <sup>00</sup>				э	э	э	э	э				э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э
21 <sup>00</sup> - 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	↑																													
	3 дня			5 дней				2 дня				5 дней				2 дня				5 дней				2 дня		5 дней				1 день

2-й курс назначать через 2 месяца после окончания 1-го курса или с момента рецидивирования

2-й лечебный **интенсивный комбинированный курс** 21 день

20 ампул ЭРБИСОЛа® (э) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Время																						
6 <sup>00</sup> - 9 <sup>00</sup>		2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+
21 <sup>00</sup> - 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	↑																					↓
	19 дней																					

Инъекции препаратов желательно делать на голодный желудок за 1-2 часа до еды или через 2-3 часа после еды. Чай, соки, воду и т.п. можно употреблять в любое время.

Примечание:

- э - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® внутримышечно;
- + - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® Экстра внутримышечно.