ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

В комплексной терапии ***тяжелых травм и переломов*** применять **системную терапию пульсирующего и интенсивного комбинированного курсов иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации препаратами ЭРБИСОЛ® Экстра и ЭРБИСОЛ®.**

1-й лечебный пульсирующий курс 30 дней
50 ампул ЭРБИСОЛа® (э)

Дни / Время	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6^{00} - 9^{00}				э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э	
21^{00} - 24^{00}	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э

↕3 дня↕ 5 дней ↕2дня↕ 5 дней ↕2дня↕ 5 дней ↕2дня↕ 5 дней ↕1↕

Через 2 месяца после окончания 1-го курса провести 2-й курс.

2-й лечебный интенсивный комбинированный курс 21 день
20 ампул ЭРБИСОЛа® (э) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

Дни / Время	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6^{00} - 9^{00}		2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+
21^{00} - 24^{00}	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	

↕1↕ 19 дней ↕1↕

Инъекции препаратов желательно делать на голодный желудок за 1-2 часа до еды или через 2-3 часа после еды. Чай, соки, воду и т.п. можно употреблять в любое время.

Примечание:
э - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® внутримышечно;
+ - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® Экстра внутримышечно.