

Електроний доступ: <http://kisref.ru/stat385518.html>

Реєстр. № 179/30/09

1. Застосування препарату **Ербісол** в комплексному лікуванні хворих на хронічний ларингіт з супутнім аутоімунним тиреоїдитом
2. Підвищення ефективності лікування хронічного ларингіту у хворих на хронічний ларингіт з супутнім аутоімунним тиреоїдитом
3. Беручи до уваги той факт, що у хворих на хронічний ларингіт з супутнім аутоімунним тиреоїдитом в більшості випадків діагностують порушення у клітинній ланці імунітету, цим хворим у комплекс лікування доцільно призначати препарат Ербісол. Ербісол вводять внутрішньом'язово по 2 мл щоденно 1 раз на добу. Курс лікування – 20 днів.
4. Лікарський засіб Ербісол: 2 мл розчину для внутрішньом'язових ін'єкцій (по 10 ампул в упаковці).
5. Хронічний ларингіт з супутнім аутоімунним тиреоїдитом
6. Індивідуальна непереносимість
7. В найкоротший термін в комплексній терапії покращує загальний стан хворих з хронічним ларингітом і значно подовжує термін ремісії
8. Препарат добре переноситься хворими. Але в деяких випадках, у перші 2-5 днів прийому, препарат може викликати загострення хронічного запального процесу, що у більшості випадків є стадією лікувального процесу. Відміни препарату не потребує.
9. Методичні рекомендації; доповіді на конференціях.
10. НДР "Особливості запалення ЛОР-органів у хворих з ендокринною патологією" 010U002868, 2005 – 2009 р.р.
11. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.
12. Г.І. Гарюк, (057) 704-16-16, О.О. Кулікова
13. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.2008р.).
14. Навчання на курсах ХМАПО, консультації.