

КАРДИОЛОГИЯ

1. В комплексной терапии *кардиоваскулярной патологии* применять **стандартный курс** иммуномодуляции, гепатопротекции, репарации и адаптации препаратом ЭРБИСОЛ®

Лечебный курс 20 дней 30 ампул ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰			э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э								
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
			3 дня ↓					10 дней							↓	7 дней					↓

2. В комплексной терапии *ишемической болезни сердца с хронической сердечной недостаточностью кровообращения I-II функционального класса по классификации NYHA* применять **интенсивный курс** иммуномодуляции, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратом ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 21 день 60 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Время																						
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰		2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		↓1↑								19 дней												↓1↑

3. В комплексной терапии *ишемической болезни сердца с хронической сердечной недостаточностью кровообращения III функционального класса по классификации NYHA** применять **стандартный пролонгированный курс** препарата ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 20-30 дней 40-60 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																													
Время																																																											
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																														
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																														
		↓																																																									↓
		20-30 дней																																																									

* У больных с более выраженной хронической сердечной недостаточностью кровообращения проведение такого стандартного пролонгированного курса целесообразно только после ее стабилизации на уровне III функционального класса по классификации NYHA.

4. В комплексной терапии *сочетанной патологии сердечно-сосудистой системы, на фоне которой развился сахарный диабет 2-го типа*, применять **системную терапию интенсивного комбинированного курса** иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации препаратами ЭРБИСОЛ® и ЭРБИСОЛ® Экстра и **интенсивного пролонгированного курса** иммуномодуляции, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратом ЭРБИСОЛ® Экстра.

