

# ДЕРМАТОЛОГИЯ

В комплексном лечении *псориаза* применять **системную терапию пульсирующего и интенсивного комбинированного курса** иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации препаратами ЭРБИСОЛ® и ЭРБИСОЛ® Экстра.

## 1-й лечебный пульсирующий курс 30 дней 50 ампул (2 мл) ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Время																															
6 <sup>00</sup> - 9 <sup>00</sup>				э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э		
21 <sup>00</sup> - 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	
	↑3 дня ↓			↑ 5 дней ↓					↑2дня ↓						↑ 5 дней ↓					↑2дня ↓									↑ 5 дней ↓	↑1 ↓	

Рекомендовано с 11-го дня назначить местное применение специфических лечебных мазей и кремов в течение 10-20 дней.

2-й курс назначать через 2 месяца после окончания 1-го курса или при рецидиве.

## 2-й лечебный интенсивный комбинированный курс 21 день 20 ампул ЭРБИСОЛа® (э) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+) желательно начинать за 2 дня до новолуния

	новолуние										полнолуние											
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Время																						
6 <sup>00</sup> - 9 <sup>00</sup>		2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+
21 <sup>00</sup> - 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	↑1 ↓																					↑1 ↓
	19 дней																					

Инъекции препаратов желательно делать на голодный желудок за 1-2 часа до еды или через 2-3 часа после еды. Чай, соки, воду и т.п. можно употреблять в любое время.

Примечание:

э - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® внутримышечно;

+ - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® Экстра внутримышечно.