

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

1. В терапии *реактивного гепатита и гепатозов* рекомендовано применять **стандартный курс** иммуномодуляции, гепатопротекции, репарации и адаптации препаратом ЭРБИСОЛ®

Лечебный курс 20 дней 30 ампул ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰				э	э	э	э	э	э	э	э	э									
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	3 дня ↓			10 дней							↓	7 дней							↓		

2. В комплексной терапии *стеатогепатита и язвенно-эрозивных поражений желудочно-кишечного тракта* применять **системную терапию стандартного курса № 2** и стандартного курса препарата ЭРБИСОЛ®

**1-й лечебный стандартный курс № 2 22 дня
40 ампул ЭРБИСОЛа® (э)**

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Время																						
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰				э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	3 дня ↓			18 дней																		↓1↓

Через 2 месяца после окончания 1-го курса провести 2-й курс.

**2-й лечебный стандартный курс 20 дней
30 ампул ЭРБИСОЛа® (э)**

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰				э	э	э	э	э	э	э	э	э									
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	3 дня ↓			10 дней							↓	7 дней							↓		

3. В комплексной терапии больных *при переходе гепатита в цирроз печени* применять **системную терапию пульсирующего и стандартного курсов** препарата ЭРБИСОЛ®

**1-й лечебный пульсирующий курс 30 дней
50 ампул ЭРБИСОЛа® (э)**

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Время																																	
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰				э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э				э	э	э	э	э			
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э		
	3 дня ↓			5 дней					↓	2 дня ↓		5 дней					↓	2 дня ↓		5 дней					↓	2 дня ↓		5 дней					↓1↓

Через 2 месяца после окончания 1-го курса провести 2-й курс.

Эрбисолотерапия

– системное поэтапное комплексное применение препаратов класса ЭРБИСОЛ®

1. Эрбисолотерапия при неспецифическом язвенном колите

1-й этап - применять **интенсивный комбинированный пролонгированный курс** иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации препаратами ЭРБИСОЛ® и ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 27 дней.

30 ампул ЭРБИСОЛа® (э) + 50 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)
желательно начинать на 3-й день полнолуния.

	↓ полнолуние		Новолуние												↓ полнолуние														
			↓ микроклизмы 10																										
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Время																													
6 ⁰⁰ – 9 ⁰⁰					э	э	э	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	
21 ⁰⁰ – 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	
	↑ 7 дней							↑ 20 дней																				↑	

После окончания 1-го этапа без перерыва перейти ко 2-му этапу.

2-й этап – применять **стандартный пролонгированный комбинированный курс** иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации препаратами ЭРБИСОЛ® и ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 36 дней

10 ампул ЭРБИСОЛа® (э) + 80 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)

	↓ микроклизмы 10												↓ микроклизмы 10												↓													
Дни	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
Время																																						
6 ⁰⁰ – 9 ⁰⁰	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
21 ⁰⁰ – 24 ⁰⁰	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	↑ 30 дней																														↑ 6 дней						↑	

2 (3) курса микроклизм 10 дней по 1 ампуле 2 мл ЭРБИСОЛа® Экстра на 50 мл воды. Интервал между курсами микроклизм 5-10 дней.

В дальнейшем, в зависимости от состояния здоровья проводить курсы **Лечебно- профилактической Эрбисолотерапии** или **Лечебно- оздоровительной Эрбисолотерапии**

2. Эрбисолотерапия

при циррозе печени 1-2 стадии

(по шкале METAVIR по показаниям эластографии или фибро-теста)

1-й этап - применять **интенсивный комбинированный пролонгированный курс** иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации препаратами ЭРБИСОЛ® и ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 27 дней.

30 ампул ЭРБИСОЛа® (э) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

желательно начинать на 3-й день полнолуния

	↓ полнолуние			↓ новолуние											↓ полнолуние													
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Время																												
6 ⁰⁰ – 9 ⁰⁰					Э	Э	Э	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+
21 ⁰⁰ – 24 ⁰⁰	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э
	↓ 7 дней							↓ 20 дней																				↓

Через 2 месяца после окончания 1-го этапа перейти ко 2-му этапу.

2-й этап - применять **интенсивный комбинированный курс** иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации препаратами ЭРБИСОЛ® и ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 21 день

20 ампул ЭРБИСОЛа® (э) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

желательно начинать за 2 дня до новолуния

		↓ новолуние																			↓ полнолуние		
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Время																							
6 ⁰⁰ – 9 ⁰⁰		2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	
21 ⁰⁰ – 24 ⁰⁰	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
	↑1	↓ 19 дней																			↑1		

Через 2 месяца после окончания 2-го этапа перейти к 3-му этапу.

3-й этап - применять **интенсивный курс** иммуномодуляции, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратом ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 21 день

60 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

↓ новолуние

↓ полнолуние

		↓ новолуние																			↓ полнолуние		
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Время																							
6 ⁰⁰ – 9 ⁰⁰		2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	
21 ⁰⁰ – 24 ⁰⁰	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	↑1	↓ 19 дней																			↑1		

В дальнейшем, в зависимости от состояния здоровья проводить курсы

Лечебно- профилактической Эрбисолотерапии или
Лечебно- восстановительной Эрбисолотерапии

3. Эрбисолотерапия

при циррозе печени 3-4 стадии

(по шкале METAVIR по показаниям эластографии или фибро-теста)

1-й этап применять **интенсивный комбинированный пролонгированный курс** иммунотерапии, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратами ЭРБИСОЛ® УЛЬТРАфарм и ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 32 дня
40 ампул ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм (у) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

	↓ полнолуние ↓			↓ новолуние ↓										↓ полнолуние ↓																					
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
Время																																			
6 ⁰⁰ – 9 ⁰⁰				у	у	у	у	у	у	2+	2+	2+	2+	2+	у	у	у	у	у	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	
21 ⁰⁰ – 24 ⁰⁰	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	+	+
	↕3 дня↕			↕5 дней↕					↕5 дней↕					↕5 дней↕					↕12 дней↕									↕2дн↕							

Через 7-9 недель после окончания 1-го этапа перейти ко 2-му этапу.

2-й этап применять **интенсивный комбинированный курс** иммунотерапии, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратами ЭРБИСОЛ® УЛЬТРАфарм и ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 21 день
20 ампул ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм (у) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

	↓ новолуние ↓										↓ полнолуние ↓											
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Время																						
6 ⁰⁰ – 9 ⁰⁰			2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+
21 ⁰⁰ – 24 ⁰⁰	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у
	↕1↕										↕19 дней↕										↕1↕	

Через 2 месяца после окончания 2-го этапа перейти к 3-му этапу.

3-й этап - применять **интенсивный курс** иммуномодуляции, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратом ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 21 день
60 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)

	↓ новолуние ↓										↓ полнолуние ↓											
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Время																						
6 ⁰⁰ – 9 ⁰⁰			2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+
21 ⁰⁰ – 24 ⁰⁰	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	↕1↕										↕19 дней↕										↕1↕	

В дальнейшем, в зависимости от состояния здоровья проводить курсы

Лечебно-восстановительной Эрбисолотерапии

Инъекции препаратов желательно делать на голодный желудок за 1-2 часа до еды или через 2-3 часа после еды. Чай, соки, воду и т.п. можно употреблять в любое время.

Примечание:

- э - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® внутримышечно;
- + - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® Экстра внутримышечно;
- у - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм внутримышечно.