НЕВРОЛОГИЯ

1. В комплексной терапии ***при реабилитации постинсультных состояний*** применять **стандартный пролонгированный курс** иммуномодуляции, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратом ЭРБИСОЛ® Экстра.

Лечебный курс 20-30 дней
40-60 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)

Дни / Время	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6^{00} - 9^{00}	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
21^{00} - 24^{00}	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

↕ 20-30 дней ↕

2. В комплексной терапии ***при реабилитации больных с демиелизирующими полиневропатиями, болезнью Паркинсона*** применять **полуинтенсивный пульсирующий курс** препарата.

Лечебный курс с 2-3 пятидневками 25-30 дней
с 2 пятидневками 25 дней 60 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)

Дни / Время	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6^{00} – 9^{00}	+	+	+	+	+	+	+	2+	2+	2+	2+	2+	+	+	2+	2+	2+	2+	2+	+	+	+	+	+	+
21^{00} – 24^{00}	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

↕ 7-9 дней ↕ 5 дней ↕2дня↕ 5 дней ↕ 6 дней ↕

с **3 пятидневками 30 дней 75 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)**

Дни / Время	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6^{00} – 9^{00}	+	+	+	+	+	+	+	2+	2+	2+	2+	2+	+	+	2+	2+	2+	2+	2+	+	+	2+	2+	2+	2+	2+	+	+	+	+
21^{00} – 24^{00}	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

↕ 7-9 дней ↕ 5 дней ↕2дня↕ 5 дней ↕2дня↕ 5 дней ↕ 4 дня ↕

3. В комплексной терапии ***рассеянного склероза*** применять **интенсивный комбинированный пульсирующий курс** иммунотерапии, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратами Эрбисол® Ультрафарм и Эрбисол® Экстра.

Лечебный курс 24 дня
20 ампул Эрбисол® Ультрафарм (**у**) + 35-40 ампул Эрбисол® Экстра (+)

Дни / Время	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6^{00} – 9^{00}		+	+	2+	2+	2+	2+	2+	+	+	2+	2+	2+	2+	2+	+	+	2+	2+	2+	2+	2+		
21^{00} - 24^{00}	у	у	у	у	у	у	у	у	+	+	у	у	у	у	у	+	+	у	у	у	у	у	у	у

3 дня ↕ 5 дней ↕2дня↕ 5 дней ↕2дня↕ 5 дней ↕2дня↕

В случае появления напряженности мышц, приводящее к ухудшению двигательных функций, во 2-й и 3-й пятидневках можно снизить дозу Эрбисол® Экстра и применять препарат утром поочередно – один день 2 ампулы **2+** (4,0 мл), другой 1 ампула **2+** (2,0 мл).

Примечание:
+ - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® Экстра внутримышечно;
у - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм внутримышечно.