

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

В пульмонологической клинике имеется уникальная возможность сочетанного (общего и местного) применения препаратов класса ЭРБИСОЛ®. Местное лечение проводится небулайзерными ингаляциями. Тактику лечения и методику их применения определяет лечащий врач в зависимости от характера неспецифического бронхолегочного воспалительного процесса.

1. В комплексной терапии *острого бронхита, пневмонии и обострении хронических неспецифических бронхолегочных заболеваний* применять **стандартный курс** иммуномодуляции, гепатопротекции, репарации и адаптации препаратом ЭРБИСОЛ®

Лечебный курс 20 дней 30 ампул ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰				э	э	э	э	э	э	э	э	э									
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	3 дня ↓			10 дней							↓			7 дней							↓

В период разрешения неспецифического бронхолегочного воспалительного процесса целесообразно применить 10 сеансов ингаляций небулайзером ЭРБИСОЛ® Экстра (на ночь ½ ампулы).

2. В комплексной терапии *неспецифических бронхолегочных заболеваний с наличием патогенных микробно-вирусных ассоциаций* применять **интенсивный комбинированный пролонгированный курс** иммунотерапии, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратами ЭРБИСОЛ® УЛЬТРАфарм и ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 31 день

40 ампул ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм (у) + 40 ампул ЭРБИСОЛа Экстра (2+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Время																																
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰			у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у
	↓2дня↓		9 дней			↓		10 дней							↓		10 дня							↓								

В период разрешения неспецифического бронхолегочного воспалительного процесса с наличием патогенных микробно-вирусных ассоциаций целесообразно применить 10 сеансов ингаляций небулайзером ЭРБИСОЛ® (на ночь ½ ампулы).

3. При лечении саркоидоза* органов дыхания применять системную терапию стандартными курсами препарата ЭРБИСОЛ®

(*Морфологическим субстратом саркоидоза является грануломатозное воспаление. Основной структурной единицей гранулемы является макрофаг с неполноценным процессом фагоцитирования антигенного раздражителя. Презентация макрофагом такого раздражителя лимфоцитам-хелперам (CD4+) вызывает продукцию комплекса цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-4, ИФН-γ). Препарат ЭРБИСОЛ® активируя макрофаги, непосредственно способствует восстановлению полноценности процессов фагоцитирования и формированию полноценной специфической адаптивной иммунной реакции организма. Исходя из изложенного, воздействие препарата ЭРБИСОЛ® является удачной этиопатогенетической альтернативой лечения саркоидоза иммунодепрессантами)

1-й лечебный курс 20 дней 30 ампул ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰				э	э	э	э	э	э	э	э	э									
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э

3 дня ↓ 10 дней ↑ 7 дней ↓

Через 2 месяца после окончания 1-го курса провести 2-й курс.

2-й лечебный курс 20 дней 30 ампул ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰				э	э	э	э	э	э	э	э	э									
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э

3 дня ↓ 10 дней ↑ 7 дней ↓

Через 2 месяца после окончания 2-го курса провести 3-й курс.

3-й лечебный курс 20 дней 30 ампул ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰				э	э	э	э	э	э	э	э	э									
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э

3 дня ↓ 10 дней ↑ 7 дней ↓

4. В комплексной лечении туберкулеза легких применять системную терапию пульсирующего и стандартного курсов препарата ЭРБИСОЛ®

1-й лечебный пульсирующий курс 30 дней 50 ампул ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Время																															
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰				э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э		
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	

↓ 3 дня ↓ 5 дней ↓ 2 дня ↓ 5 дней ↓ 1 ↓

Через 2 месяца после окончания 1-го курса провести 2-й курс.

**2-й лечебный стандартный курс 20 дней
30 ампул ЭРБИСОЛа® (э)**

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰				э	э	э	э	э	э	э	э	э	э								
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	3 дня ↓			10 дней							↑	7 дней			↓						

*При показаниях через каждые 2 месяца проводить очередные **стандартные курсы** препарата ЭРБИСОЛ®*

Инъекции препаратов желательно делать на голодный желудок за 1-2 часа до еды или через 2-3 часа после еды. Чай, соки, воду и т.п. можно употреблять в любое время.

Примечание:

- э - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® внутримышечно;
- + - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® Экстра внутримышечно;
- у - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм внутримышечно.