

СТОМАТОЛОГИЯ

В стоматологической клинической практике имеется уникальная возможность сочетанного (местного и общего) применения препаратов класса ЭРБИСОЛ®. Тактику лечения и методику применения препаратов определяет лечащий врач. В зависимости от характера течения патологического процесса в тканях пародонта и наличия сопутствующих соматических заболеваний будет различной и тактика лечения препаратами класса ЭРБИСОЛ®.

1. В комплексной терапии *генерализованного пародонтита хронического течения* применять **стандартный курс** иммуномодуляции, гепатопротекции, репарации и адаптации препаратом ЭРБИСОЛ®

Лечебный стандартный курс 20 дней
30 ампул ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰				э	э	э	э	э	э	э	э	э									
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э

3 дня ↓ 10 дней ↑ 7 дней ↓

2. В комплексной терапии *генерализованного пародонтита хронического или обострившегося течения** на фоне соматической патологии (*обострение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, хронического гепатита, панкреатита, псориаза*) применять **стандартный курс № 2** препарата ЭРБИСОЛ®

Лечебный стандартный курс № 2 22 дня
40 ампул ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Время																						
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰				э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э

3 дня ↓ 18 дней ↑↓

* по классификации Н.Ф.Данилевского, 1998 года

3. В комплексной терапии больных *красным плоским лишаем* применять **системную терапию стандартного курса № 2** и **стандартного курса** препарата ЭРБИСОЛ®

1-й лечебный стандартный курс № 2 22 дня
40 ампул ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Время																						
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰				э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э

3 дня ↓ 18 дней ↑↓

Через 2 месяца после окончания 1-го курса провести 2-й курс.

**2-й лечебный стандартный курс 20 дней
30 ампул ЭРБИСОЛа® (э)**

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰				э	э	э	э	э	э	э	э	э	э								
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	3 дня ↓			10 дней							↓	7 дней							↓		

4. В комплексной терапии *простого герпеса слизистой оболочки полости рта и губ* применять **пульсирующий курс** препарата ЭРБИСОЛ®

**Лечебный пульсирующий курс 30 дней
50 ампул ЭРБИСОЛа® (э)**

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Время																															
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰				э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э		
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	3 дня ↓			5 дней					↓2дня↓		5 дней					↓2дня↓		5 дней					↓2дня↓		5 дней					↓1↓	

5. В комплексной терапии *рецидивирующего герпеса слизистой оболочки полости рта и губ* применять **интенсивный комбинированный пролонгированный курс** иммунотерапии, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратами ЭРБИСОЛ® УЛЬТРАфарм и ЭРБИСОЛ® Экстра

**Лечебный курс 31 день
40 ампул ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм (у) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)**

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Время																																
6 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰			у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	
21 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	
	↓2дня↑			9 дней							↓	20 дней																				↓

Инъекции препаратов желательнее делать на голодный желудок за 1-2 часа до еды или через 2-3 часа после еды. Чай, соки, воду и т.п. можно употреблять в любое время.

Примечание:

- э - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® внутримышечно;
- + - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® Экстра внутримышечно;
- у - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм внутримышечно.

Местное применение препаратов класса ЭРБИСОЛ® можно осуществлять в виде аппликаций и инстилляций, а также физиотерапевтическими методами. Однако при наличии новообразований, переломов и металлических конструкций в полости рта, заболеваний, сопровождаемых нарушениями ритма сердца, экстрапирамидными расстройствами применение электропроцедур категорически противопоказано.

Механический метод. После удаления зубных отложений и устранения всех местных раздражающих факторов тканей пародонта на десны накладывают смоченные препаратами класса ЭРБИСОЛ® ватные (марлевые) ленты или пасту их смеси с высокодисперсионным диоксидом кремния в соотношении 1:1. Пасту готовят непосредственно *ex tempore* следующим образом: к 0,5-1,0 г смеси добавляют 3-6 мл дистиллированной воды и тщательно перемешивают. Продолжительность экспозиции аппликации 15-20 минут, что обеспечивает всасывание препарата тканями пародонта. Курс лечения составляет 8-10 сеансов. Также при наличии пародонтальных карманов их активно обрабатывают раствором антисептических препаратов, после чего вводят турунды, смоченные раствором препарата.

Активное введение препарата ЭРБИСОЛ® методами электрофореза и ультрафонофореза. Перед проведением лечения необходимо зафиксировать отсутствие у больного противопоказаний.

Методом электрофореза препарат ЭРБИСОЛ® вводится с положительного электрода. При этом на выбранный участок десны накладывается смоченная раствором препарата марлевая салфетка и активный (положительный) электрод. Отрицательный электрод накладывается на смоченную водой марлевую салфетку на предплечье руки. Продолжительность процедуры 10 минут.

Ультрафонофорез проводится с помощью озвучивания с частотой 800 кГц и мощностью 0,2-0,6 Вт/см². При этом на десны накладывается марлевая салфетка, смоченная теплым раствором препарата ЭРБИСОЛ®, к которой необходимо приложить излучатель ультразвукового аппарата. Между поверхностью излучателя и салфеткой не должно быть пузырьков воздуха. Во время процедуры по обрабатываемой части десны не отрывая от салфетки производится медленное перемещение активной поверхности излучателя. Продолжительность процедуры 7-10 минут, на курс лечения - до 10 процедур.

После сеанса электротрофореза или ультрафонофореза для пролонгирования действия препарата ЭРБИСОЛ® на десны рекомендовано наложить быстроотвердеющую пародонтальную повязку.