

# ТОКСИКОЛОГИЯ

1. В комплексной терапии *легких форм отравлений* применять **стандартный курс** иммуномодуляции, гепатопротекции, репарации и адаптации препаратом ЭРБИСОЛ®

**Лечебный курс 20 дней                      30 ампул ЭРБИСОЛа® (э)**

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 <sup>00</sup> - 9 <sup>00</sup>				э	э	э	э	э	э	э	э	э	э								
21 <sup>00</sup> - 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	3 дня ↓			10 дней							↓	7 дней							↓		

2. В комплексной терапии *тяжелых форм отравлений* применять **пульсирующий курс** препарата ЭРБИСОЛ®

**Лечебный курс 30 дней                      50 ампул ЭРБИСОЛа® (э)**

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Время																															
6 <sup>00</sup> - 9 <sup>00</sup>				э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э		
21 <sup>00</sup> - 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	
	↓3 дня ↓			5 дней					↓2дня ↓		5 дней					↓2дня ↓		5 дней					↓2дня ↓		5 дней			↓1 ↓			

Инъекции препаратов желательно делать на голодный желудок за 1-2 часа до еды или через 2-3 часа после еды. Чай, соки, воду и т.п. можно употреблять в любое время.

Примечание:

э - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® внутримышечно.